


SYNTHESIS OF 6-TERT-OCTYL AND 6,8-DITERT-BUTYL COUMARINS, TWO COUMARINS OF BIOLOGICAL INTEREST

M. ZÁRRAGA O.^{1}, M. DAROUCH¹, E. LISBOA¹, P. ARROYO P.¹ AND A. MIRANDA M.²*


¹Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción, Edmundo Larenas 234, Concepción, Chile.

²Departamento de Química, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, José Pedro Alessandri 774, Ñuñoa, Santiago, Chile.



SUPPLEMENTARY INFORMATION




¹H-NMR spectrum of 6-tert-octyl-2-oxo-2H-chromene-3-methylcarboxylate.




¹³C-¹³C-NMR spectrum of 6-tert-octyl-2-oxo-2H-chromene-3-methylcarboxylate.



¹H-NMR spectrum of 6,8-di-tert-butyl-2-oxo-2H-chromene-3-methylcarboxylate.¹³C-NMR spectrum of 6,8-di-tert-butyl-2-oxo-2H-chromene-3-methylcarboxylate




FTIR spectrum of 6,8-ditert-butyl-2-oxo-2H-chromene-3-methylcarboxylate.



¹H-NMR spectrum of 2-hydroxy-5-tert-octylbenzaldehyde.





¹³C-NMR spectrum of 2-hydroxy-3,5-ditert-butylbenzaldehyde.